

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
乳癌	AC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 アドリアシン注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週 4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	高度	◎ (内服)	16T/day2-4
乳癌	CMF	エンドキサン錠 100mg/m ² 経口 day1~14 5-FU 600mg/m ² 点滴 day 1.8 メトトレキセート注 40mg/m ² 静注 day1.8 【1コース4週 6サイクル】	●エンドキサン⇒2週間投薬、2週休 薬	中等度		
乳癌	CPT-11(乳癌)	イリナカン注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22 【1コース6週】		中等度		
乳癌	Docetaxel+GEM	ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 ジエムゲール注 1250mg/m ² 点滴day 1.8 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		
乳癌	Docetaxel+HER	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 ハーセプチン注 2mg/kg 点滴 day1.8.15 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事 ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	FEC100(外来用)	エンドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピシンRTU注 100mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4~6サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ (内服)	16T/day2-4

乳癌	FEC100(入院用)	インドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピシンRTU注 100mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	インドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ (内服)	16T/day2-4
乳癌	FEC75 (外来用)	インドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピシンRTU注 75mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	インドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ (内服)	16T/day2-4
乳癌	FEC75 (入院用)	インドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピシンRTU注 75mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	インドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ (内服)	16T/day2-4
乳癌	GEM(乳癌)	ジエムゲール注 1250mg/m ² 点滴 day 1.8 【1コース3週】		軽度		
乳癌	GEM+HER	ジエムゲール注 1250mg/m ² 点滴 day 1.8 ハーセプチン注 2mg/kg 点滴 day 1.8.15 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	PER+HER+DOC(乳癌) (初回用)	パージエタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		

乳癌	PER+HER+DOC(乳癌) (2回目以降)	パージェタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		
乳癌	TC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用 アルコール過敏の有無を確認する事	中等度		16T/day2-4
乳癌	triDOC (乳癌)	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		
乳癌	triHER(Adj) (初回用)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	triHER(Adj)(2回目以降)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	VNB	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 【1コース3週】		軽度		
乳癌	VNB+triHER (初回用)	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		

乳癌	VNB+triHER(2回目以降)	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wHER (乳癌) (初回用)	ハーセプチン注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wHER (乳癌) (2回目以降)	ハーセプチン注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wPTX (乳癌)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	wPTX+Bevacizumab	パクリタキセル注 90mg/m ² 点滴 day 1.8.15 アバスチン注 10mg/kg 点滴 day 1.15 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	軽度		
乳癌	wPTX+HER	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 ハーセプチン注 2mg/kg 点滴 day 1.8.15.22 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wPTX+HER(NAC) (初回用)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 ハーセプチン注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。	軽度		

乳癌	WPTX+HER(NAC)(2回目以降)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 ハーセプチン注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる	軽度		
乳癌	WPTX-NAC	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 【1コース1週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	アブラキサン(乳癌)	アブラキサン注 260mg /m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり	軽度		
乳癌	アブラキサン (HER)tri (初回用)	アブラキサン注260mg/m ² 点滴 day 1 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる	軽度		
乳癌	アブラキサン (HER)tri (2回目以降)	アブラキサン注260mg/m ² 点滴 day 1 ハーセプチン注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる	軽度		
乳癌	カドサイラ (乳癌)	カドサイラ3.6mg/kg 点滴 day 1 【1コース3週】	カドサイラは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	ハラヴェン	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 【1コース3週】		軽度		

乳癌	ハラヴェン+HER (初回用)	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	ハラヴェン+HER (2回目以降)	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	triDOC (乳癌) (NAC)(Adj)	ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		