

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
大腸癌	Bev.+FOLFIRI (SV2.5)	ペバシズマブBS注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース2週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Bev.+mFOLFOX6 (SV2.5)	ペバシズマブBS注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース2週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	中等度		
大腸癌	Bev.+CAPOX	ペバシズマブBS注 7.5mg/kg 点滴 day 1 オキサリプラチン注 130mg/m ² 点滴 day 1 カペシタビン 2000mg/m ² /day 経口 day 1~14 【1コース3週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 ●カペシタビン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		
大腸癌	Bev.+Cape	ペバシズマブBS注 7.5mg/kg 点滴 day 1 カペシタビン 2000mg/m ² /day 経口 day1~14 【1コース3週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 ●カペシタビン⇒2週間投薬、1週間休薬	軽度		
大腸癌	Bev.+UFT/LV	ペバシズマブBS注 5mg/kg 点滴 day 1・15 ユーロフティー 30mg/m ² /day 経口 day1~21 ユーゼル 75mg/day 経口 day1~21 (1日3回食事の前後1時間は避けて) 【1コース4週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 ●UFT/LV⇒3週間投薬、1週間休薬	軽度		
大腸癌	Bev.+TS-1	ペバシズマブBS注 5mg/kg 点滴 day 1・15・29 S-1 80mg,100mg,120mg/day 経口 day 1~28 【1コース6週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 ●S-1⇒4週間投薬、2週休薬	軽度		
大腸癌	Bev.+sLV5FU2 (SV2.5)	ペバシズマブBS注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース2週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	軽度		
大腸癌	Bev.+SOX(大腸癌)	ペバシズマブBS注 7.5mg/kg 点滴 day1 オキサリプラチン注 130mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg, 100mg, 120mg/day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		

大腸癌	Cet.+CPT-11 (初回用)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 リリチカ注 150mg/m ² 点滴 day1 【1コース2週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Cet.+CPT-11 (2回目以降)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 リリチカ注 150mg/m ² 点滴 day1 【1コース2週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Cet.+FOLFIRI (SV2.5) (初回用)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day1 リリチカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU (bolus) 400mg/m ² 5-FU (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Cet.+FOLFIRI (SV2.5) (2回目以降)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day1 リリチカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU (bolus) 400mg/m ² 5-FU (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Cet.+mFOLFOX6 (SV2.5) (初回用)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
大腸癌	Cet.+mFOLFOX6 (SV2.5) (2回目以降)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		

大腸癌	CPT-11(大腸癌)	リリカ注 150mg/m ² 点滴 day1.15 【1コース 5週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4 4mg/day16-18
大腸癌	FOLFIRI (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース2週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	FOLFIRI(急速静注なし) (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース3週】		中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	CPT-11+S-1 (大腸癌)	リリカ注 150mg/m ² 点滴 day1.15 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース 4週】	●S-1⇒2週間投薬、2週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4 4mg/day16-18
大腸癌	mFOLFOX6 (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
大腸癌	Panitumumab	ベクティビクス注 6mg/kg 点滴 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	最小度		
大腸癌	Panitumumab+CPT-11	ベクティビクス注 6mg/kg 点滴 day 1 リリカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Panitumumab+FOLFIRI (SV2.5)	ベクティビクス注 6mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Panitumumab+mFOLFOX6 (SV2.5)	ベクティビクス注 6mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度		
大腸癌	SLV5FU2 (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース 2週】		中等度		
大腸癌	SOX	オキサリプラチン注 130mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		

大腸癌	wCetuximab (初回用)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1 【1コース1週】		最小度		
大腸癌	wCetuximab(2回目以降)	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1 【1コース1週】		最小度		
大腸癌	CAPOX	林ガリア注 130mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		
大腸癌	RAM+FOLFIRI(SV2.5)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリテカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	FOLFOXIRI(SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリテカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 林ガリア注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
大腸癌	Bev.+FOLFOXIRI(SV2.5)	ベバシズマブBS注 5mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリテカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 林ガリア注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
大腸癌	CAPIRI	リリテカ注 200mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 1600mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Bevacizumab+CAPIRI	ベバシズマブBS注 7.5mg/kg day 1 リリテカ注 200mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 1600mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
大腸癌	Aflibercept+FOLFIRI(SV2.5)	ザルトラプ注 4mg/kg 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 リリテカ注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4

大腸癌	Bevacizumab+〇ンサ-フ	ベバシズマブBS注 5mg/kg 点滴 day1・day15 〇ンサ-フ錠 35mg/m ² /回 1日2回 day1-5 内服 day6-7休薬 day8-12内服 day13-28休薬 【1コース4週】	●〇ンサ-フ錠 35mg/m ² /回 1日2回 day1-5 内服 day6-7休薬 day8-12内服 day13-28休薬	中等度		
大腸癌	Cetuximab (初回用) +ピラフトビ+メクトビ	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1 ピラフトビカプセル 1回300mg 1日1回連日内服 メクトビ錠 1回45mg 1日2回連日内服 【1コース1週】	●ピラフトビカプセル 1回300mg 1日1回連日内服 ●メクトビ錠 1回45mg 1日2回連日内服	最小度		
大腸癌	Cetuximab(2回目以降) +ピラフトビ+メクトビ	アービタックス注 400mg/m ² (初回投与時) 250mg/m ² (2回目以降投与時) 点滴 day1 ピラフトビカプセル 1回300mg 1日1回連日内服 メクトビ錠 1回45mg 1日2回連日内服 【1コース1週】	●ピラフトビカプセル 1回300mg 1日1回連日内服 ●メクトビ錠 1回45mg 1日2回連日内服	最小度		