

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
膵癌	アブラキサン+GEM (膵癌)	アブラキサン注 125mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 ゲムシタピン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		
膵癌	FOLFIRINOX(膵癌)	オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリチン注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
膵癌	オニバイド+5-FU/I-LV	オニバイド注 70mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
膵、 胆道癌	S-1+GEM	ゲムシタピン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 8.15 S-1 60mg/m <sup>2</sup> /日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) <b>●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬</b>	軽度		
膵癌	GEM (膵)	ゲムシタピン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		
胆道癌	GEM (胆道癌)	ゲムシタピン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 【1コース6週】	ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		

胆道癌	GEM+CDDP (胆道癌)	シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1,8 ゲムシタビン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1,8 【1コース3週】	ゲムシタビン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4 8mg/day9-11
胆道癌	GEM+CDDP+S-1(胆道癌)	シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 ゲムシタビン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 S-1 80mg/m <sup>2</sup> /日 経口投与 day 1から7 【1コース2週】	●S-1⇒1週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胆道癌	デュルバルマブ+GEM+CDDP(胆道癌) 最大8コース	ゲムシタビン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1,8 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1,8 イミフィンジ注 1500mg/body 点滴 day1 【1J-3週 1~8コース】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！ ゲムシタビン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) 当院採用レジメンでは高度催吐リスクとして扱う 最大8コースまで。以降はデュルバルマブのメンテナ ンスへ	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4 8mg/day9-11
胆道癌	デュルバルマブ(胆道癌) メンテナンス	イミフィンジ注 1500mg/body day1 【1J-3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		
胆道癌	デュルバルマブ+GEM+CDDP(胆道癌) 体重30kg以下 最大8コース	ゲムシタビン注 1000mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1,8 シスプラチン注 25mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1,8 イミフィンジ注 20mg/kg 点滴 day1 【1J-3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！ ゲムシタビン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) 当院採用レジメンでは高度催吐リスクとして扱う 最大8コースまで。以降はデュルバルマブのメンテナ ンスへ	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4 8mg/day9-11
胆道癌	デュルバルマブ(胆道癌) 体重30kg以下 メンテナンス	イミフィンジ注 20mg/kg 点滴 day1 【1J-3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		