

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
卵巣癌	TC子宮体癌、卵巣癌	パクリタキセル注 175mg/m ² 点滴 day 1 カルボプラチン注 AUC=6 点滴 day 1 【1コース3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
卵巣癌	dose-denceTC子宮体癌、卵巣癌	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1・8・15 カルボプラチン注 AUC=6 点滴 day 1 【1コース3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度		
卵巣癌	CBDCA+DOC(卵巣癌)	ドセタキセル注 70mg/m ² 点滴 day 1 カルボプラチン注 AUC=5 点滴 day 1 【1コース3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること アルコール過敏の有無を確認すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
卵巣癌	卵巣癌 (CDDP+CPT+11)	リリチカ注 60mg/m ² 点滴 day 1 シスプラチン注 30mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
卵巣癌	CPT-11 (卵巣癌)	リリチカ注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】		中等度		
卵巣癌	CPT-11+MMC卵巣癌	リリチカ注 100mg/m ² 点滴 day 1 マイトマイシン 10mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】		中等度		
卵巣癌	GEM卵巣癌	ゲムシタピン注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		
卵巣癌	Doxil投与量90mg以下(卵巣癌)	ドキシル注 50mg/m ² 点滴 day 1 【1コース4週】	ドキシル投与前から投与終了後まで 冷却バンド装着 インラインフィルターは使用しない事	軽度		
卵巣癌	Doxil投与量90mg以上(卵巣癌)	ドキシル注 50mg/m ² 点滴 day 1 【1コース4週】	ドキシル投与前から投与終了後まで 冷却バンド装着 インラインフィルターは使用しない事	軽度		
卵巣癌	Bevacizumab+TC(卵巣癌)	パクリタキセル注 175mg/m ² 点滴 day 1 カルボプラチン注 AUC=6 点滴 day 1 ベバシズマブBS注 15mg/kg 点滴 day1 【1コース3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4

卵巣癌	Bevacizumab(卵巣癌)	ベバシズマブBS注 15mg/kg 点滴 day 1 【1コース3週】		最小度		
-----	------------------	--	--	-----	--	--

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
子宮体癌	AP (DXR+CDDP)	ドキシルピシン:60mg/m ² day1 シスプラチン:50mg/m ² day1 【1コース3週】		高度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
子宮体癌	TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル注:175mg/m ² day1 カルボプラチン注:AUC=6 day1 【1コース3週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること アレルギー過敏の有無を確認すること	中等度	◎ (点滴:アロカリス)	8mg/day2-4
子宮体癌	ペムブロリズマブ (3週間隔) +レンバチニブ	キイトルーダ 200mg/body 3週に1回 レンバチニブ 20mg/日 連日内服	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		
子宮体癌	ペムブロリズマブ (6週間隔) +レンバチニブ	キイトルーダ 400mg/body 6週に1回 レンバチニブ 20mg/日 連日内服	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		
子宮体癌	ペムブロリズマブ(3週間隔)	キイトルーダ 200mg/body 3週に1回	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		
子宮体癌	ペムブロリズマブ (6週間隔)	キイトルーダ 400mg/body 6週に1回	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		