

| 癌種 | プロトコール名 | レジメン内容 | 注意事項 | 催吐リスク | Nk1受容体拮抗薬 | 内服デカドロン |
|------|------------------|--|--|-------|-----------------|------------|
| 膀胱癌 | GC療法 | ゲムシタビン注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8.15 シスプラチン注 70mg/m ² 点滴 day 2 【1コース4週】 | ゲムシタビン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | 8mg/day3-5 |
| 膀胱癌 | MVAC療法 | メトトレキサート 30mg/m ² 点滴 day 1.15.22 VLB 3mg/m ² 点滴 day 2.15.22 ADR 30mg/m ² 点滴 day 2 CDDP 70mg/m ² 点滴 day2 【1コース4週】 | | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | 8mg/day3-5 |
| 膀胱癌 | BEP療法 | シスプラチン注 20mg/m ² 点滴 day 1~5 ラステット注 100mg/m ² 点滴 day 1~5 プレオ 15mg 筋注 day 1 朝 プレオ 15mg 筋注 day 1 夕 【1コース3週】 | | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | |
| 膀胱癌 | MEC療法 | メトトレキサート 30mg/m ² 点滴 day 1.15 ファルモルピシン 50mg/m ² 点滴 day 1 シスプラチン注 100mg/m ² 点滴 day2 【1コース3週】 | | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | 8mg/day3-5 |
| 膀胱癌 | MEC療法 (CDDP分割投与) | メトトレキサート 30mg/m ² 点滴 day 1.15 ファルモルピシン 50mg/m ² 点滴 day 1 シスプラチン注 50mg/m ² 点滴 day 2.3 【1コース3週】 | | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | |
| 前立腺癌 | 前立腺癌DOC (3W) | ドセタキセル注 70mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】 | アルコール過敏の有無を確認する事 | 軽度 | | |
| 前立腺癌 | 前立腺癌DOC (weekly) | ドセタキセル注 30mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】 | アルコール過敏の有無を確認する事 | 軽度 | | |
| 前立腺癌 | カバジタキセル | ジエブタナ注 25mg/m ² day1 プレドニゾロン (経口) 5mg×2回 連日経口投与 【1コース3週】 | 発熱性好中球減少症 (FN)リスク高い 入院管理での治療 | 軽度 | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|---|---|-----|-----------------|--|
| 膀胱癌 | ピロルビン膀胱注 | ピロルビン20mg 膀胱内注入 | TUR-BT手術当日 TUR-BT術後1日目 TUR-BT術後2日目以降 | | | |
| 膀胱癌 | GC動注療法(両側) | ゲムシタビン注 1000mg/m ² 動注 day 1.8.15 シスプラチン注 70mg/m ² 動注 day 2 【1コース4週】 | 動注ポートより抗がん剤は投与 50mLのシリンジで払い出し | 高度 | ◎ (注射：アロカリス) | |
| 尿路上皮癌 | ペムブロリズマブ (3週間隔) (尿路上皮癌) | キイトルーダ注 200mg 点滴 day1 【1コース3週】 | PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！ | 最小度 | | |
| 尿路上皮癌 | ペムブロリズマブ (6週間隔) (尿路上皮癌) | キイトルーダ注 400mg 点滴 day1 【1コース6週】 | PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！ | 最小度 | | |